

Mogelijke bijwerkingen

- Omdat het bloed 'verdund' wordt, is er een verhoogde kans op bloedingen of bloedingen (bv. neusbloedingen, langdurig nabloeden bij wonden ...)
- Lichte reacties zoals irritatie of pijn ter hoogte van de insteekplaats zijn mogelijk.
- Allergische reacties treden zelden op. Contacteer je huisarts bij huiduitslag, koorts, zwelling ...



MEER INFO?

Heb je na het lezen van de folder nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met je huisarts of je behandelend arts.

Surf naar mariamiddelares.be voor meer info over onze diensten en contactgegevens.



AZ Maria Middelares en AZ Sint-Vincentius Deinze hebben deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. Deze folder is indicatief en vervangt de raadpleging bij je arts niet. Mocht deze folder vergissingen of onvolledigheden bevatten, dan zijn AZ Maria Middelares, AZ Sint-Vincentius Deinze, hun medewerkers en artsen hiervoor niet aansprakelijk.

Inspuitingen met Clexane®



PATIËNTENINFORMATIE



Buitenring Sint-Denijs 30, 9000 Gent
09 246 46 46 | info@mijnziekenhuis.be

mariamiddelares.be

Volg ons ook op:     



Schutterijstraat 34, 9800 Deinze
09 387 71 11 | info.deinze@mijnziekenhuis.be

SAP 25721 | mei 2024



BESTE PATIËNT,

Je arts heeft beslist dat je inspuitingen met Clexane® nodig hebt. In deze folder lichten we toe hoe je het geneesmiddel aan jezelf of aan iemand anders kan toedienen.

Wat is Clexane®?

Clexane® is een **antistollingsmedicijn** dat wordt voorgeschreven bij patiënten die tijdelijk minder mobiel zijn. Daardoor is er namelijk risico op vorming van bloedklonters.

- Clexane® stopt de groei van bestaande bloedklonters
- Clexane® voorkomt de vorming van nieuwe bloedstolsels


Hoe wordt Clexane® toegediend?

Clexane® wordt door middel van een **inspuiting** toegediend. Belangrijk is dat dit **dagelijks rond hetzelfde tijdstip** gebeurt.


De vloeistof wordt onder de huid ingespoten, meestal via een huidplooi in de buik. Als dit niet mogelijk is, kan Clexane® ook toegediend worden via een huidplooi aan de bovenzijde van het bovenbeen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- ➔ Was je handen
- ➔ Kies de injectieplaats uit, bij voorkeur een vijftal cm links of rechts van de navel. Wissel dagelijks af.




- ➔ Ontsmet de prikplaats of was met water en zeep.
- ➔ De spuit is gebruiksklaar. Het is niet nodig om de luchtbel uit het spuitje te verwijderen.
- ➔ Ga rustig en ontspannen zitten of liggen in een comfortabele houding.
- ➔ Verwijder het beschermkapje, leg nadien de spuit niet meer neer.
- ➔ Neem een huidplooi vast en breng de naald loodrecht in de huidplooi in.



- ➔ Duw de stamper rustig naar beneden zodat de vloeistof ingespoten wordt.



- ➔ Trek de naald er loodrecht uit en laat dan pas de huidplooi los.



- ➔ Er kan een druppel bloed uit de wonde komen maar meestal is een pleister niet nodig.
- ➔ Wrijf niet over de insteekplaats om blauwe plekken te voorkomen.

Verzamel de gebruikte spuitjes in een naaldcontainer of afgesloten recipiënt. Je kan deze inleveren bij de apotheker.