



MEER INFO?

Het is mogelijk dat je na het lezen van deze folder nog vragen hebt. Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze dienst geriatrie:

➔ **09 246 89 00**

Neem een kijkje op mariamiddelares.be voor meer info over osteoporose.



AZ Maria Middelares en AZ Sint-Vincentius Deinze hebben deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. Deze folder is indicatief en vervangt de raadpleging bij je arts niet. Mocht deze folder vergissingen of onvolledigheden bevatten, dan zijn AZ Maria Middelares, AZ Sint-Vincentius Deinze, hun medewerkers en artsen hiervoor niet aansprakelijk.

Denosumab

tegen osteoporose



PATIËNTENINFORMATIE



Buitenring Sint-Denijs 30, 9000 Gent
09 246 46 46 | info@mijnziekenhuis.be

mariamiddelares.be

Volg ons ook op:




Schutterijstraat 34, 9800 Deinze
09 387 71 11 | info.deinze@mijnziekenhuis.be

SAP 25748 | juni 2024



Wat is denosumab?

Denosumab of Prolia® wordt gebruikt **voor de behandeling van patiënten met osteoporose** (botontkalking). Osteoporose ontstaat door natuurlijke botafbraak. Geleidelijk aan worden botten dunner en brozer, waardoor ze gemakkelijker kunnen breken.



Hoe werkt denosumab?

Denosumab is een eiwit dat de botafbrekende cellen (osteoclasten) remt. Daardoor verbetert de botdichtheid, krijgt het bot een betere botstructuur en neemt de kans op een (nieuwe) botbreuk af.

» Doel van een behandeling met denosumab is je botten sterker maken en de kans op (nieuwe) botbreuken verminderen.

Hoe verloopt een behandeling?

Denosumab wordt toegediend via een **onderhuidse injectie** in je bovenbeen, bovenarm of buik.

- ➔ Je **huisarts** kan dit voor je doen.
- ➔ Je kan er ook voor opteren om (na de eerste toediening door een arts) de volgende injecties thuis door een **thuisverpleegkundige** te laten plaatsen.
- ➔ Je kan de injectie eventueel ook **zelf** plaatsen (na de eerste toediening door een arts). Je arts of verpleegkundige zal je in dit geval uitleggen hoe je zelf correct de injecties kan toedienen.



Denosumab wordt **1 keer per 6 maanden** toegediend. De optimale behandelduur van denosumab wordt nog onderzocht.



Overleg steeds met je behandelend arts als je wil stoppen met het gebruik van denosumab. Op eigen houtje stoppen kan leiden tot ongewenste effecten. **Stop dus nooit zomaar.**

Hoe bewaar ik denosumab?

- ➔ Bewaar denosumab **in de koelkast** (temperatuur tussen 2°C en 8°C).
- ➔ Bewaar denosumab **in de originele verpakking** ter bescherming tegen licht.
- ➔ Haal de injectiespuiten **een half uur voor toediening uit de koelkast** om op kamertemperatuur te laten komen.

Wanneer mag ik denosumab niet krijgen?

Voor een behandeling met denosumab opgestart wordt, zal je arts je nierfunctie en het calciumgehalte in je bloed controleren. Als er **grote problemen met je nierfunctie** zijn of als je een **lage hoeveelheid calcium (kalk) in je bloed** hebt, krijg je denosumab niet toegediend.

Welke risico's zijn er?

De meeste patiënten ondervinden **geen of nauwelijks bijwerkingen** van dit geneesmiddel. Volgende bijwerkingen kunnen optreden bij het gebruik van denosumab:

- ➔ Spier- en gewrichtspijn.
- ➔ Zenuwpijn in de bil en/of het been.
- ➔ Buikklasten, obstipatie.
- ➔ Infecties van de urinewegen, bovenste luchtwegen of huid.
- ➔ Een beschadiging van je kaakbot (zelden) door een verminderde doorbloeding (osteonecrose van de kaak). Verzorg daarom goed je gebit en ga jaarlijks naar de tandarts.
- ➔ Bij overgevoeligheid aan denosumab kunnen allergische reacties optreden zoals huidafwijkingen, koorts of benauwdheid. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met je huisarts.