

Transoesofagale echografie



INHOUD

1.	Wat is een transoesofagale echografie	4
1.1	Een echografie met plaatselijke verdoving van de keel	5
1.2	Een echografie onder volledige verdoving	6
2.	Wat zijn de risico's	8
2.1	Risico's bij onderzoek met plaatselijke verdoving van de keel	8
2.2	Risico's bij onderzoek onder volledige verdoving	8
3.	Veelgestelde vragen	9
	Contactgegevens	10

Beste patiënt

Binnenkort kom je naar AZ Maria Middelaes voor een **transoesofagale echocardiografie**. In deze brochure trachten we je zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat dat precies inhoudt.

Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met je arts of de verpleegkundigen. Zij zullen je graag te woord staan.

team cardiologie



Surf ook eens naar www.mariamiddelaes.be
of www.hartcentrum.be voor meer info.

1 Wat is een transoesofagale echografie?

Je behandelend arts heeft voorgesteld om een echografisch onderzoek van je hart te laten uitvoeren via de slokdarm. Dit onderzoek heet een transoesofagale echocardiografie (TEE).


De meest voorkomende redenen om een TEE uit te voeren, zijn:

→ OPSPOREN VAN KLONTERS IN HET HART BIJ BEPAALDE RITMESTOORNISSEN

→ MEER GEDETAILLEERDE INFORMATIE VERKRIJGEN BIJ KLEPPROBLEMEN

→ OPSPOREN VAN HARTKLEPINFECTIES

→ OPSPOREN VAN EEN OPENING TUSSEN DE VOORKAMERS VAN HET HART.




Afhankelijk van de reden voor een transoesofagale echografie kan er een voorkeur zijn om het onderzoek onder plaatselijke verdoving of onder een kortstondige volledige verdoving uit te voeren.

Je moet voor dit onderzoek **nuchter** zijn: dit is 8 uur voor een gewone maaltijd, 6 uur voor een lichte maaltijd en melkproducten en 2 uur voor heldere dranken.

1.1 Echografie met plaatselijke verdoving van de keel

- Je neemt plaats op de behandeltafel van de arts. De keel wordt plaatselijk verdoofd met een spray en je krijgt een mondstukje tussen de tanden om het inbrengen van de sonde te vergemakkelijken. Er wordt een dun en plooibaar buisje in de slokdarm gebracht. Omdat het hart juist voor de slokdarm ligt, kan de arts op deze manier nauwkeurige informatie krijgen. Tijdens het inbrengen van de sonde zal de cardioloog je vragen om te slikken. Hierbij kan je een wurg- en of braakreflex voelen. Als de sonde ter plaatse is, zal je deze reflex(en) niet meer krijgen.
- Omdat je keel verdoofd is, moet je na het onderzoek wachten met eten en drinken om verslikken te voorkomen. Ongeveer twee uur na het onderzoek kan je voorzichtig proberen om een slokje water te drinken.



Alle richtlijnen en praktische info over anesthesie vind je op onze website:
www.mariamiddelares.be/nl/zorgaanbod/anesthesie/praktisch

1.2 Echografie onder volledige verdoving

VOORBEREIDING

Je wordt opgenomen in ons cardiologisch dagziekenhuis. Je mag je thuismedicatie innemen zoals afgesproken met de arts. Indien nodig wordt er bloed afgenomen.

Je krijgt een operatiehemdje aan en de verpleegkundige plaatst een infuus in je arm om later medicatie toe te dienen. Als je een gebitsprothese hebt, zal gevraagd worden om deze voor het onderzoek uit te doen.

De ingreep gebeurt onder een kortstondige, volledige verdoving en gaat door in het echocardiografielokaal. Dit lokaal is voorzien van alle noodzakelijke apparatuur.

DE ECHOGRAFIE

Er worden een aantal kleefelektroden aangebracht om je hartritme te volgen. Je krijgt een bloeddrukmeter aan je arm en een klepje op je vinger om je zuurstofgehalte te meten. Zo kunnen we alles goed controleren tijdens de echo en de verdoving.

De anesthesist plaatst een mondstukje tussen je tanden en dient de slaapmedicatie toe via het infuus. Je krijgt extra zuurstof via een masker.

Er wordt een dun, plooibaar buisje in de slokdarm gebracht. Omdat het hart juist voor de slokdarm ligt, kan zo nauwkeurige informatie verkregen worden.

NAZORG

Na de echografie word je naar het cardiologisch dagziekenhuis gebracht waar je na enkele minuten terug wakker zal worden.

Het eerste uur wordt het hartritme gevolgd met de monitor. Als je goed wakker bent, mag je iets eten en drinken en mag je naar huis.

Zorg voor iemand die je kan begeleiden, want je mag zelf niet met de wagen rijden.



2 Wat zijn de risico's?


2.1 Risico's bij onderzoek met plaatselijke verdoving van de keel

In geval van lokale keelspray maak je het onderzoek bewust mee. Soms treden hierbij lichte wurg- of braakneigingen op. Na het onderzoek kan je keel een tijdje geïrriteerd zijn.

2.2 Risico's bij onderzoek onder volledige verdoving

Na het onderzoek kan je keel wat geïrriteerd zijn, je kan je suf voelen of draaierig zijn (als gevolg van de anesthesie). Verwikkelingen van deze procedure zijn zeldzaam.

Uiterst zeldzaam is een perforatie (= scheur) van de slokdarm. In dit geval moet je opgenomen worden voor observatie en eventueel een ingreep ondergaan. Een bloeding als gevolg van een echocardiografie via de slokdarm is zeldzaam en kan meestal zonder operatie behandeld worden. Beschadiging van tanden (vooral bij een slecht gebit) is niet uitgesloten tijdens een endoscopie of een verdoving.



3 Veelgestelde vragen

▶ IS EEN ECHO VIA DE SLOKDARM PIJNLIJK?

Als je voor een echo onder volledige verdoving koos, zal je hiervan niks voelen. Lichte irritatie van je keel achteraf is mogelijk. Als je wakker blijft voor de echografie, zal de arts je keel lokaal verdoven met een spray. Ook hier zal je dus geen pijn voelen. Achteraf kan je wel een lichte geïrriteerde keel hebben.

▶ HOE LANG DUURT HET ONDERZOEK?

Het onderzoek zelf duurt een tiental minuten en ongeveer een half uur met de voorbereiding erbij.

▶ WANNEER MAG IK TERUG ETEN EN DRINKEN?

Doorgaans mag je ongeveer twee uur na het ontwaken eten en drinken. Je moet eerst goed wakker zijn. Ook bij gebruik van een lokale keelspray moet je twee uur wachten om verslikken te voorkomen.

▶ WANNEER KAN IK TERUG AAN HET WERK?

Als je volledig verdoofd werd, kan je de dag nadien terug aan het werk.

▶ MAG IK MET DE WAGEN RIJDEN NA HET ONDERZOEK?

Als je voor het onderzoek volledig verdoofd werd, mag je zelf niet met de wagen rijden. Zorg voor een begeleider die je naar huis kan brengen. Blijf je wakker, dan kan je gerust zelf de wagen besturen.




Contact gegevens

Heb je nog bezorgdheden of nood aan ondersteuning, aarzel dan niet om ons te contacteren.

➤ **Secretariaat cardiologie**
09 246 86 00

GEZONDHEIDSZORG MET EEN ZIEL

AZ Maria Middelaes heeft deze informatiebrochure met de grootste zorg opgemaakt. Deze brochure is indicatief en vervangt de raadpleging bij je arts niet. Mocht deze brochure vergissingen of onvolledigheden bevatten, dan zijn AZ Maria Middelaes, zijn medewerkers en zijn artsen hiervoor niet aansprakelijk.





Deze brochure is gedrukt op maxioffset.
Papier afkomstig uit bossen die duurzaam
worden beheerd.

VOLG ONS OOK OP:



Gezondheids**Zorg** met een Ziel